



АФРИЧКА КУГА СВИЊА

БОЛЕСТ СЕ ШИРИ:

- контактом заражених са здравим свињама;
- исхраном свиња помијама у којима има контаминираних остатака хране;
- контаминираном храном, водом;
- инфицираним крпељима;
- одећом и обућом;
- контаминираним предметима и опремом;
- превозним средствима;
- стајњаком;
- лешевима угинулих и закланих животиња;
- глодарима;
- инсектима.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:

- не хранити свиње помијама;
- избегавати пашно држање свиња;
- спречити директан контакт са дивљим свињама ;
- особе које су биле у контакту са дивљим свињама морају добро опрати и дезинфекцијати одећу и обућу;
- обавезна пријава сваке болесне или угинуле домаће или дивље свиње надлежном ветеринару;
- поставити дезбаријере на улазу и излазу у објекат где се држе свиње

АФРИЧКА КУГА СВИЊА ЈЕ ВИРУСНА,
ВЕОМА ОПАСНА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ
ДОМАЋИХ И ДИВЉИХ СВИЊА!



НЕМА ЛЕЧЕЊА

ВАКЦИНА НЕ ПОСТОЈИ

КАКО ПРЕПОЗНАТИ АФРИЧКУ КУГУ СВИЊА:

- изненадно угинуће једне и више свиња ;
- губитак апетита;
- потиштеност;
- повишена телесна температура до 42°ц ;
- крварења по кожи (најчешће по ушима, њушци, репу, ногама, stomaku и бочним странама трупа);
- крвав пролив;
- побачаји;
- несигурност у ходу;
- отежано дисање;
- кашљање, повраћање.

ОБОЉЕВАЈУ СВИЊЕ СВИХ КАТЕГОРИЈА!
УГИНУ СВЕ ОБОЛЕЛЕ ЖИВОТИЊЕ!

ВИРУС АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА НЕ ПРЕДСТАВЉА
ОПАСНОСТ ЗА ЉУДЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ
ЖИВОТИЊА

У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ АКС СПРОВОДИ СЕ
УБИЈАЊЕ СВИХ СВИЊА НА ГАЗДИНСТВУ.